

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO Y ACTUACIÓN EN CASO DE ALERGIA ALIMENTARIA

Servicio Médico

Dra. Raquel Medina Martínez

Col. 281304221

ALERGIA A LOS ALIMENTOS

SINTOMAS

**LEVES
MODERADOS**



Erupción cutánea
Urticaria (picor)
Lagrimeo - Enrojecimiento ocular
Irritación nasal
Tos
Diarrea
Vómitos



Dificultad respiratoria - Asma
Hipotensión - Mareo
Opresión torácica - Palpitaciones
Choque anafiláctico (riesgo de muerte)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

CASOS LEVES / MODERADOS

SIEMPRE

**Antihistamínicos
(POLARAMINE®)**

Niños 2 - 6 años ———> 1,25 ml

Niños 6 - 12 años ———> 2,5 ml

Mayores de 12 años ———> 5 ml

Si erupción cutánea (granitos
o enrojecimiento localizado:
cara, zona de roce del
alimento...)

Lavar la zona con suero
(o agua y jabón)
+
Corticoides tópicos
(Synalar crema)

PROTOCOLO ACTUACIÓN CASOS GRAVES (I)



¡ANAFILAXIA!

PROTOCOLO ACTUACIÓN CASOS GRAVES (II)

SIEMPRE

POLARAMINE®

Niños 2 - 6 años ———> 1,25 ml

Niños 6 - 12 años ———> 2,5 ml

Mayores de 12 años ———> 5 ml

PITOS/ASMA

**VENTOLÍN INHALADOR
(SALBUTAMOL EFG)
2 PUFF**

**PERSISTE AHOGO
DESMAYO**

INYECTABLE ADRENALINA

JEXT®

• JEXT 150 (2 - 10 AÑOS)

• JEXT 300 (>10 AÑOS)

USO INYECTOR ADRENALINA

Copiar esta dirección web para ver el vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=MhFnwz3PEHo#action=share>